

“Advance care planning”
a předem vyslovená přání
u Alzheimerovy nemoci (AN)

MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Symptomatická terapie AN

podpoření kognitivních funkcí

(kognitiva)

ovlivnění behaviorálních projevů

(farmakologické/nefarmakologické postupy)

**cílem je navodit pomalejší progresi symptomů u
léčených pacientů**

Paliativní léčba AN

cílem je zajistit komfort a důstojné umírání pro pacienta v terminálním stadiu demence

rehabilitace

analgetika

neuroleptika

antidepresiva...

Pokročilé stadium demence

těžký kognitivní deficit

MMSE < 10

závislost na ošetrovatelské péči při všech aktivitách
(hygiena, oblékání, příjem potravy atd.)

Terminální stadium demence

ireverzibilní výrazná nesoběstačnost v základních sebeobslužných aktivitách

nutnost trvalé ošetrovatelské péče

Terminální stadium demence

ireverzibilní výrazná nesoběstačnost v základních sebeobslužných aktivitách

nutnost trvalé ošetrovatelské péče

- masivní těžké nezvratné kognitivní postižení
- minimální komunikace
- omezená/vymizelá schopnost přijímat jídlo a tekutiny
- plná inkontinence
- upoutání na lůžko

AD - pokročilá a terminální fáze: jaká intenzita léčby?

- PEG?
- UPV?
- operace fraktury krčku?
- i.v. ATB?
- dialýza?
- institucionalizace?
- domácí hospic?
- příprava end-of-life?
- předem vyslovená přání?

Důsledky špatně nastavené léčby

„unnecessary suffering“

konflikty

vyhoření

fluktuace zdravotníků

finanční dopady

Definice „neadekvátní léčby“

(disproportionate care)

je považována ošetřujícím týmem

za neadekvátní

vzhledem k očekávané prognóze

ve smyslu přežití a kvality života

Příklad: vysazování kognitiv

klinický stav pacienta s AN

kognice / poruchy chování

kontroverze pojišťovna / úhrada

domácí péče / instituce

Medical futility at the end of life: the perspectives of intensive care and palliative care clinicians

Ralf J Jox,¹ Andreas Schaidler,² Georg Marckmann,¹ Gian Domenico Borasio³

Proč lékaři někdy poskytují
marnou léčbu?

Reasons for providing futile treatment

Personal reasons (55)

Ignorance about legal palliative options (8)

Hope for a miracle (4)

Concerns & fears (11)
- of death
- of litigation
- of reaction by patient or family

Other emotions (17)
- Helplessness
- Grief
- Guilt
- Mercy
- Injured pride

Institutional barriers (20)

Delay (11)
- Establishing prognosis
- Reaching consensus
- Needs of patient or family

Treatment wish of patient/family (5)

Professional ethos (5)

Organisational automatisms (4)

Problém



- beneficence
- non maleficence
- spravedlnost
- autonomie



- beneficence
- non maleficence
- spravedlnost
- ~~autonomie~~

Předem vyslovená přání

- **písemná forma**
- **úředně ověřený podpis**
- **písemné poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí**, a to praktik nebo jiný ošetřující lékař v oboru zdravotní péče, s nímž dříve vyslovené přání souvisí
- Pacient může učinit dříve vyslovené přání též při přijetí do péče poskytovatelem nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace.
- Takto vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; **záznam podepíše pacient, zdravotnický pracovník a svědek**

Léčba pokročilé demence – paliativní přístup

MUDr. Robert Rusina¹, MUDr. MgA. Kateřina Rusinová², doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.³,
doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.⁴

Neurol. pro praxi 2010; 11(1): 16–19

Terminální stadium demence je fáze, kdy onemocnění přechází do ireverzibilní výrazné nesoběstačnosti v základních sebeobslužných aktivitách s nutností trvalé ošetrovatelské péče. V článku je věnována pozornost podávání kognitiv, schopnosti rozhodování a principu autonomie u těchto pacientů. Je diskutována indikace intenzivní a resuscitační péče, role paliativní léčby a některé postupy při léčení komplikací. Dále je zmiňován význam komunikace s pacientem a pečovatelem i problematika umístění do ústavního zařízení.